


医療法人社団まりも会 ヒロシマ平松病院 臨床指標（令和7年度）

集計期間：令和7年4月1日～令和8年3月31日




まりも会マスコットキャラクター
マリオ・マリコ

1. チーム医療

1-1 d2以上の褥瘡発生率(%)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.6	1.5	0.3	0.9	0.9	1.9	0.6	0.9	0.6	1.3	0.3	0.9



褥瘡は患者のQOL(生活の質)の低下をきたし、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にも繋がる。そのため褥瘡予防対策は患者さまに提供されるべき医療の重要な項目の一つとなっている。


分子：d2以上の褥瘡の院内新規発生褥瘡患者数

分母：入院患者のべ数

1-2 NST・摂食嚥下

NST介入患者数(人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
46	20	28	37	14	33	57	40	32	27	19	28



介入終了時評価

改善	55
不変	42
増悪	14

NST対象者リスク要因(人) ※重複あり

Alb低値(3.0未満)	40
低体重(BMI 16.5以下)	32
必要量に対する充足率70%以下	85
褥瘡	15
摂食嚥下障害	31
HDS-R 20点以下	57



栄養障害のある患者さまや栄養管理が必要な患者さまに対して、生活の質の向上、原疾患の治療促進及び感染症等の合併症予防などを目的として栄養サポートチームによる回診(NST※1回診)を行っている。

NST介入患者総数：栄養アセスメント評価に基づくNST介入患者数

※1 多職種(医師、管理栄養士、看護師等)による患者への適切な栄養管理を実施し支援する栄養サポートチーム

言語聴覚士による摂食嚥下機能評価患者数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
16	17	2	10	11	14	18	13	17	15	19	26

言語聴覚士による摂食嚥下機能訓練介入患者数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
10	9	12	13	11	9	6	11	6	8	14	9




75歳以上の入院患者さまに摂食嚥下スクリーニング検査を実施し、摂食嚥下の問題がある患者さまに言語聴覚士が詳細な評価を行ったうえで多職種と共同して治療、ケア、訓練の調整や実施に取り組んでいる。

1-3 身体的拘束率(%)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5.1%	3.7%	0.6%	1.3%	2.4%	4.2%	4.2%	1.7%	2.4%	0.8%	2.3%	3.5%

身体的拘束を実施した日数(上段)と入院料算定日数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
226	162	25	54	97	170	189	72	108	37	96	163
4395	4323	4204	4144	4008	4017	4459	4176	4559	4461	4180	4600



身体的拘束は『身体拘束の三原則』に則り、実施している。患者さまの心身の安定のためにも身体的拘束最小化に継続して取り組む必要がある。

分子:分母のうち(物理的)身体拘束を実施した日数の総和

分母:入院料算定日数


物理的身体拘束:四点柵、抑制着、ミトン、四肢抑制、胴抑制、車椅子ベルト

1-4 入院患者の転倒転落発生率(‰)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.65	2.65	1.70	1.75	1.64	2.31	2.90	2.37	2.84	1.11	3.06	0.64

転倒転落発生件数(上段)と入院患者延べ数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7	11	7	7	7	9	13	10	13	5	13	3
4246	4154	4109	4011	4278	3893	4484	4218	4585	4509	4253	4674



インシデント・アクシデントレポートによる報告に基づいて集計。

転倒・転落件数は1事象に対し複数報告された場合でも1とカウントする。

分子:転倒・転落発生件数


分母:のべ入院日数

1-5 骨折リエゾンサービス(Fracture Liaison Service; FLS)治療率

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
72%	71%	83%	63%	69%	77%	91%	65%	80%	77%	93%	81%

対象患者数(上段)、治療開始・継続患者数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
18	17	6	16	13	13	11	23	20	26	14	16
13	12	5	10	9	10	10	15	16	20	13	13



さまざまな職種の連携により、脆弱性骨折を受傷された患者さまに対する「骨粗鬆症治療開始率」「治療継続率」を上げるとともに、転倒予防を実践することで二次骨折を防ぐ骨折リエゾンサービス(FLS)に取り組んでいる。

分子：治療開始・継続患者数

分母：対象患者数

1-6 排尿自立支援

介入依頼患者数(上段)、介入患者数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
13	9	10	11	11	7	11	4	8	15	11	12
18	14	30	20	24	18	52	22	18	33	21	29



多職種からなる排尿ケアチームを組織し、手術など治療上の理由により使用していた尿道カテーテルを抜去するにあたって、排尿自立の可能性及び下部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハビリテーション、薬物療法等を組み合わせるなど、下部尿路機能の回復のための包括的なケア(包括的排尿ケア)を行っている。

1-7 入退院支援

予定入院患者数(上段)、入院支援患者数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
129	121	132	133	118	110	122	113	131	124	120	135
23	29	30	29	39	63	81	70	94	72	86	52

退院支援患者数(一般病棟(上段)、地域包括ケア病棟(中段)、回復期リハビリテーション病棟(下段))


4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
17	20	23	28	35	51	62	63	76	61	64	38
27	29	24	25	22	35	31	40	50	37	51	40
30	24	20	17	25	23	33	25	59	27	31	32



入院される患者さまが入院生活をスムーズに送り、より早い時期により良い状態で退院して、退院後もその人らしい生活を送ることができるよう、入院前からの支援を強化するとともに、在宅退院に向けて、地域の医療機関や介護施設との連携を図り、必要なサービスや支援に取り組んでいる。

2. 診療

2-1 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率




手術前に抗菌薬(細菌感染によって引き起こされる感染症の治療を行うために使用する薬)を投与して、手術部位の感染を予防するよう努めている。

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数

分母:全身麻酔で予防投与が実施された手術件数

2-2 全身麻酔手術患者に対する歯科介入率




全身麻酔の手術を受けると身体の抵抗力が落ちやすく、合併症を発症しやすくなるため、口の中の細菌が肺や血液の中に入る事で普段なら起こらない肺炎や感染などの合併症が生じることがある。当院では、手術前から十分な口腔ケアを行い、手術時に口の中をある程度清潔で綺麗な状態に整えておく口腔機能管理を行っている。

分子:歯科介入した全身麻酔手術患者数

分母:全身麻酔手術予定患者数

2-3 リスクレベル「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率




肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)は突然死を引き起こす可能性のある極めて重篤な疾患で、大きな手術後や長期臥床の際に起こる可能性がある。この予防方法には弾性ストッキングの着用や間歇的空気圧迫装置の使用、抗凝固薬療法があり、リスクレベルに応じて単独あるいは併用が推奨されている。周術期の肺血栓塞栓症の予防行為の実施は、急性肺血栓塞栓症の発生率を下げることに繋がると考えられており、ガイドラインに沿った診療プロセスが構築されているかの指標となる。

分子: 分子のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数

分母: 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数

2-4 臨床検査

血液培養2セット実施率



血液培養は2セットで行うことが診療ガイドラインにより推奨されている。診療プロセスが各種ガイドラインに則り、適切に構築・実施されているかを表す指標となる。

分子: 血液培養2セット実施検体数


分母: 検体数

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
100%	50%	56%	50%	0%	67%	89%	60%	20%	50%	100%	100%

抗菌薬使用患者数(上段)、培養提出患者数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	4	9	4	3	6	9	5	5	2	1	4
1	2	5	2	0	4	8	3	1	1	1	4



抗菌薬を適正に使用するためには、細菌培養を実施してどのような細菌が原因であるのかを調べるのが重要である。広域抗菌薬を開始する前に細菌培養が実施されているかを調べることで、抗菌薬が適正に使用されているかを評価する。


分子: 抗菌薬使用患者数

分母: 培養提出患者数

2-5 栄養

65歳以上の入院患者 早期アセスメント実施率(上段・左軸)と患者数(下段・右軸)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0%	0%	0%	0%	0%	32%	51%	69%	83%	84%	90%	95%
118	130	125	99	109	97	97	108	129	98	132	127



栄養指導件数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11	14	8	9	12	13	19	15	17	19	28	25



早期に低栄養リスクを評価し、適切な介入をすることで、在院日数の短縮、予後改善につながる。特に高齢者の栄養管理は、入院中の治療やリハビリテーション訓練だけでなく、退院後の生活にも影響を与える。

この指標は医療機関の栄養管理体制を表す指標とされている。患者さま一人一人の生活環境や生活リズム、仕事などのライフスタイルに応じた、実行しやすく継続できる食事改善の方法についてアドバイスする栄養指導にも取り組んでいる。

分子: 分母のうち、48H以内に栄養ケアアセスメントが行われた患者数

分母: 65歳以上の退院患者数

2-6 薬剤

薬剤管理指導率(入院患者比、上段)と指導件数(下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
38.0%	37.5%	42.8%	51.8%	48.7%	59.7%	58.7%	51.3%	56.2%	53.1%	55.7%	55.3%
120	122	139	171	152	185	183	164	186	164	182	192


病棟薬剤業務実施件数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
422	408	503	431	425	402	409	472	420	412	414	518

無菌製剤処理件数(処理1:上段、処理2:下段)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
28	3	7	7	4	0	1	24	6	0	0	39

後発医薬品使用割合



薬剤管理指導は、入院患者さまの薬歴管理と服薬指導を介して、患者さまの薬物療法への認識を向上させると同時に、患者さまから得られた情報を医師にフィードバックすることにより、効果的な薬物療法を支援する業務である。薬剤管理指導の実施率は、有効かつ安全な薬物療法が行われていることを表す指標になる。

分子:薬剤管理指導を実施した入院患者数

分母:入院患者数

病棟薬剤業務は、薬剤師が医師、看護師、その他の医療従事者と共に医療チームの一員として入院患者さまの薬物治療をサポートする業務をいう。患者さまの薬物アレルギーや副作用歴、薬物相互作用などの確認、薬の使用方法、注意事項、効果などの説明をしたり、医師、看護師に医薬品情報を提供することによって、有効で安全な治療が行われるよう努めている。また、薬効や副作用など、患者さまの情報を医師にフィードバックし、処方提案を行うことで、薬の適正使用を支援している。さらに、患者さまが安心して治療を受けていただけるように薬に関する質問や不安に対して説明を行うことも重要な役割である。

注射薬等の無菌製剤処理は、経験豊富な薬剤師がクリーンベンチ(空気中の細菌を取り除いた空間)において行うことが望まれ、薬剤師数の確保と充実した設備が必要となる。薬剤部の業務を評価するとともに、より高度で適切な薬物治療を提供していることを示す。

後発医薬品使用割合は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備された上で、90%以上の割合であることを目標としている。

分子:後発医薬品数量

分母:後発医薬品と後発医薬品がある先発医薬品数量

2-7 リハビリテーション

リハビリテーション介入率(入院患者比)


※上段:一般病棟、中段:地域包括ケア病棟、下段:回復期リハビリテーション病棟

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
69%	67%	63%	66%	64%	70%	69%	64%	68%	69%	67%	64%
77%	74%	73%	77%	75%	74%	78%	72%	81%	82%	80%	73%
100%	96%	100%	96%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

リハビリテーション算定単位数

※上段から運動器リハ、脳血管疾患リハ、呼吸器リハ、廃用リハ、がんリハ

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
8730	9389	9259	9246	8773	8997	9603	8552	10227	10197	9267	10000
241	327	36	11	216	337	379	311	59	63	44	197
82	97	0	107	146	295	548	292	321	120	115	143
0	0	0	116	224	173	176	139	36	0	9	33
155	231	168	221	144	195	158	110	121	58	83	71



患者1人1日あたりリハビリテーション実施単位数

※上段から一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、外来

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3
2.8	2.9	3.1	3.2	3.7	3.6	3.4	3.6	3.3	3.2	3.2	3.6
3.1	3.8	4.1	4.5	4.1	4.2	3.7	3.7	3.3	3.3	3.2	3.4
3.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

(1単位=20分)



当院では入院直後にリハビリの必要性を判断し、様々なかたちでリハビリを実施している。回復期リハビリテーション病棟は、リハビリに特化した病棟であり、365日休みなくリハビリを実施している。

患者さま一人ひとりのリハビリに十分な時間を費やすことも重要な要素である。

主な日常生活能力の評価(一般病棟および地域包括ケア病棟、自立と判定される患者の割合)

食事

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
80%	91%	89%	94%	96%	86%	91%	74%	88%	89%	92%	83%
93%	95%	95%	98%	98%	94%	95%	89%	91%	97%	100%	96%

更衣

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
63%	79%	73%	89%	82%	75%	75%	56%	73%	67%	71%	60%
76%	92%	84%	93%	96%	87%	88%	72%	82%	95%	94%	73%

トイレ動作

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
74%	84%	84%	87%	85%	80%	82%	68%	82%	78%	86%	73%
93%	93%	93%	96%	96%	91%	91%	85%	84%	97%	100%	83%

歩行

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
63%	71%	70%	77%	78%	71%	64%	48%	70%	64%	63%	58%
78%	76%	79%	76%	79%	76%	71%	57%	73%	92%	74%	69%

主な日常生活能力の評価(回復期リハビリテーション病棟、自立と判定される患者の割合)

食事

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
36%	30%	38%	43%	47%	64%	36%	35%	19%	46%	33%	47%
71%	62%	69%	74%	69%	80%	73%	73%	55%	85%	53%	74%

更衣(下衣)

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
29%	17%	31%	33%	37%	36%	25%	17%	19%	35%	30%	35%
56%	50%	58%	61%	66%	68%	61%	62%	41%	69%	47%	79%

トイレ動作

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
39%	30%	41%	57%	53%	68%	36%	26%	25%	46%	36%	50%
68%	65%	65%	74%	76%	80%	73%	69%	52%	85%	59%	77%

歩行

※上段は入院時、下段は退院時

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
26%	22%	31%	29%	33%	41%	28%	26%	16%	39%	27%	38%
68%	58%	62%	65%	66%	72%	73%	69%	48%	81%	50%	74%



一般病棟および地域包括ケア病棟の患者さまの日常生活機能はBarthel Index、回復期リハビリテーション病棟の患者さまの日常生活機能はFunctional Independence Measureで評価し、各動作が自立していると判断される患者さまの割合を入院時と退院時で分けて示した。

当院は整形外科疾患に対する運動器リハビリテーションが中心であるが、内臓の疾患や認知機能の障害を併存している患者さまも多く、全体的なリハビリテーションに取り組む必要がある。

分子:各動作の評価で自立と判断される点数の患者数

分母:日常生活機能評価を実施した患者数

2-8 回復期リハビリテーション病棟

日常生活機能評価4点以上改善した患者割合

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
50%	42%	78%	61%	83%	56%	86%	71%	65%	71%	93%	69%

各月の実績指数(単月)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
56.1	60	49.8	41.1	59.2	53.8	53.1	48.2	63.1	60.1	42.9	63.5



回復期リハビリテーション病棟は、病状が安定すれば集中的にリハビリに取り組み、身体機能や日常生活動作を改善する役割がある。患者さまが入棟される時と退棟される時の日常生活機能評価の点数の差や実績指数と呼ばれる数値は、入院されている期間内で患者さまがどのくらい日常生活能力が改善したかを知る指標となる。

日常生活機能評価4点以上改善した患者割合

分子:分母の内、日常生活機能評価の点数が入院時に比し退院時に4点以上改善した患者数

分母:退院患者数

実績指数


分子:機能的自立度評価(FIM)運動項目の利得(入棟時と退棟時の点数差)の総和

分母:実際の入院日数と算定上限日数との比の総和

2-9 在宅復帰率


地域包括ケア病棟

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
98.2%	97.0%	91.9%	87.5%	91.3%	93.3%	87.7%	83.6%	90.9%	100.0%	98.1%	93.6%



回復期リハビリテーション病棟

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
97.0%	86.2%	88.8%	87.5%	86.2%	91.3%	86.2%	95.8%	88.8%	95.8%	86.6%	96.8%




地域包括ケア病棟は、急性期の治療後の患者さまや在宅療養をされている患者さまの治療とともに在宅復帰支援を行う役割があり、在宅へ退院される患者さまの割合は72.5%以上であることが求められている。また、回復期リハビリテーション病棟は、病状が安定すれば集中的にリハビリに取り組み、身体機能や日常生活動作を改善させて在宅復帰を目指す役割があり、在宅へ退院される患者さまの割合は70%以上であることが求められている。

分子:在宅へ退院した患者数

分母:退院患者数

2-10 2週間以内退院サマリー作成率

※上段:退院患者数、下段:作成率



退院サマリーは、入院患者さまの病歴や検査所見、医療内容についてまとめた記録(要約書)のことであり、診療内容についての検証や、退院後の外来診療等では、主治医以外の患者さんに関わる全ての医療スタッフが、入院中の治療、診断情報を的確に把握するために重要な記録となる。作成期間については、一般的に、退院後の外来診察までの平均的な日数である「退院後2週間以内」が望ましいとされ(病院機能評価機構)全国的なひとつの目安となっている。

分子:退院後2週間以内に作成された退院サマリー件数

分母:退院患者数

2-11 紹介・逆紹介件数

	紹介件数		逆紹介件数	
	医科	歯科	医科	歯科
広島大学病院	699	0	144	5
広島市民病院	27	0	31	0
県立広島病院	70	0	37	5
広島赤十字・原爆病院	67	0	71	0
南区	465	409	178	409
中区	296	109	190	109
西区	126	169	64	169
東区	284	30	95	30
安佐北区	57	0	39	0
安佐南区	104	1	77	1
佐伯区	76	3	80	3
安芸区	23	17	33	17
その他	215	108	355	108



紹介とは、患者さまの状態に応じて他の医療機関から当院へ診療をご依頼いただく仕組みであり、逆紹介とは当院での治療や検査が一段落した患者さまを、地域の病院や診療所へ戻す仕組みである。

当院は、広島大学病院、広島市民病院、県立広島病院、広島赤十字・原爆病院との連携とともに、南区を中心に患者さまのお住いの地域の先生方とも連携して患者さまに最適な医療を提供するよう努めている。